

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا		المملكة المغربية	
1	الدورة العادية 2024		وزارة التربية الوطنية	
6	-الموضوع-		والتعليم الأولي والرياضة	
***			المركز الوطني للتقويم والامتحانات	
	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS		NS 34	

3h	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

المكون الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

- I. أنقل (ي) رقم كل تعريف ثم أعط المصطلح أو العبارة المناسبة له. (1ن)
1. تحليل بيولوجي للنفايات العضوية في ظروف حيوائية لإنتاج مخصبات التربة.
 2. تقنية تسمح بعزل النفايات المنزلية حسب طبيعتها قصد تثمينها.
 3. تحليل بيولوجي للنفايات العضوية في ظروف حي لاهوائية لإنتاج البيوغاز.
 4. ظاهرة طبيعية تنتج عن حجز جزء من الإشعاعات تحت الحمراء بواسطة بعض غازات الغلاف الجوي وتسمح بالحفاظ على درجة حرارة ملائمة للحياة على الأرض.
- II. يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4.
- أنقل (ي) الأزواج (1، ...)؛ (2، ...)؛ (3، ...)؛ (4، ...) ثم أنسب (ي) لكل رقم الحرف المقابل للاقتراح الصحيح. (2ن)

1. يؤدي هدم الكليكو في الجبل الشفافة إلى تحرير CO_2 أثناء تحول:	2. تؤدي تفاعلات انحلال الكليكو انطلاقاً من جزيئة كليكوز واحدة إلى إنتاج:
أ. حمض البيروفيك إلى إيثانول.	أ. 2 حمض البيروفيك و 2 ATP و $2 NADH, H^+$
ب. الإيثانول إلى حمض البيروفيك.	ب. 2 حمض البيروفيك و 2 ATP و $2 NAD^+$
ج. حمض البيروفيك إلى حمض لبنى.	ج. 2 حمض البيروفيك و 6 ATP و $2 NADH, H^+$
د. الحمض اللبنى إلى حمض البيروفيك.	د. 2 حمض البيروفيك و 6 ATP و $2 NAD^+$
3. تعتبر تفاعلات التخمر في الساركوبلازم تفاعلات:	4. أثناء التقلص العضلي، يحدث تقصير لكل من:
أ. حيوائية تنتج الحمض اللبنى و CO_2 .	أ. الشريط الفاتح والمنطقة H.
ب. حي لاهوائية تنتج الإيثانول و CO_2 .	ب. الشريط القاتم والشريط الفاتح.
ج. حي لاهوائية تنتج الحمض اللبنى و ATP.	ج. الأشرطة القاتمة والفاتحة والمنطقة H.
د. حيوائية تنتج الإيثانول و ATP.	د. الشريط القاتم والمنطقة H.

- III. أنقل (ي) الحروف أ و ب و ج و د ، ثم أكتب (ي) أمام كل حرف "صحيح" إذا كان الاقتراح صحيحاً أو "خطأ" إذا كان الاقتراح خاطئاً. (1ن)

- أ. يتم الحصول في نهاية الانقسام الاختزالي على 4 خلايا بنات مطابقة وراثياً للخلية الأم.
- ب. تتم مضاعفة ADN خلال الفترة S من مرحلة السكون.
- ج. يكون الانقسام التعادلي مسبقاً بمضاعفة ADN.
- د. ARN بوليمراز أنزيم يتدخل أثناء ترجمة ARNm.

- IV. أنقل (ي) الأزواج (1، ...)؛ (2، ...)؛ (3، ...)؛ (4، ...) ثم أنسب (ي) لكل رقم من المجموعة A الحرف المقابل له في المجموعة B. (1ن)



المجموعة A	المجموعة B
1. ADN بوليمراز	أ. مركب يتشكل من ارتباط الهيستونات و ADN
2. جزيء مركزي	ب. مركب جزيئي يتدخل في تركيب البروتينات
3. نيكليوزوم	ج. مركب بروتيني يتدخل في تركيب ARNm
4. ريبوزوم	د. بنية تربط صبيغيات نفس الصبغي
	هـ. أنزيم يتدخل في مضاعفة ADN

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين 1 (5 نقط)

يتميز مرض السمنة بإفراط في الوزن نتيجة لتراكم مهم للدهون في النسيج الودكي، يمكن أن يتسبب في أضرار صحية. بينت مجموعة من الدراسات الحديثة أنه بالإضافة إلى القيام بالنشاط الرياضي وتغيير النظام الغذائي، يشكل تغيير الاستقلاب الطاقي حلا آخر للحماية من السمنة. من أجل فهم العلاقة بين تغير الاستقلاب الطاقي والحماية من السمنة، نقترح استغلال المعطيات الآتية:

● **المعطى 1 :** تم القيام بأبحاث عند سلالتين من الفئران، فئران WT سليمة وفئران Cox6A مصابة بمرض مرتبط بخلل في الميتوكوندريات. تقدم الوثيقة 1 نتائج التتبع الأسبوعي لتغير وزن فئران السلالتين بعد إخضاعها لتغذية غنية بالدهون (HFD) ابتداءً من عمر 6 أسابيع، وتقدم الوثيقة 2 نتائج قياسات النشاط الأنزيمي لمركبات السلسلة التنفسية للميتوكوندريات في عضلات الساق عند هاتين السلالتين من الفئران.



1. انطلاقاً من الوثيقتين 1 و 2، قارن (ي) النتائج المحصل عليها عند كل من الفئران WT والفئران Cox6A ، ثم اقترح (ي) فرضية تفسر الحماية من السمنة عند الفئران Cox6A . (1.5 ن)

لتفسير الحماية من السمنة عند الفئران Cox6A رغم إخضاعها لتغذية غنية بالدهون (HFD) نقترح المعطيات التالية :


● **المعطى 2 :** تتوفر الميتوكوندريات في غشائها الداخلي على بروتين يسمى UCP . يعمل هذا البروتين في عدد من الأنسجة، مثل العضلات الهيكلية والأنسجة الودكية، كقناة مسؤولة عن زيادة نفاذية الغشاء الداخلي للبروتونات H^+ . يقدم الشكل (أ) من الوثيقة 3 نتائج قياسات درجة حرارة الجسم بعد 8 أسابيع من اتباع نظام غذائي HFD عند سلالتين الفئران، ويقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس كمية البروتين UCP في عضلة الساق عند نفس الفئران.

ملحوظة: تعبر درجة حرارة الجسم عن كمية الحرارة التي يتم تحريرها.

2. باستغلال الوثيقة 3، حدد (ي) الاختلافات الملاحظة بين سلالتَي الفئران ثم استنتج (ي) تأثير كمية UCP على كمية الحرارة التي يتم تحريرها من طرف الفئران Cox6A. (1 ن)

الوثيقة 3

● **المعطى 3 :** أظهرت الدراسات أن تغير النشاط الأنزيمي للمركب C_{IV} يؤدي إلى ارتفاع نشاط البروتين UCP المسؤول عن فقدان الوزن (الحماية من السمنة). تمثل الوثيقة 4 رسماً تفسيريًا لعمل الغشاء الداخلي للميتوكوندري ودور بروتين UCP.



3. باستغلال معطيات الوثيقة 4 والمعطيات السابقة، فسر (ي) العلاقة بين نشاط البروتين UCP، وعمل السلسلة التنفسية والحماية من السمنة عند فئران Cox6A ثم تحقق (ي) من الفرضية المقترحة. (2 ن)

4. بالإضافة إلى القيام بالنشاط الرياضي وتغيير النظام الغذائي وبالاتماد على المعطيات السابقة، اقترح (ي) على الباحثين حلاً آخر للحماية من السمنة. (0.5 ن)

التمرين 2 (6 نقط)

في إطار دراسة آليات تعبير الخبر الوراثي وانتقال بعض الصفات الوراثية، نقترح استثمار المعطيات الآتية:

I. يعتبر ميناء الأسنان نسيجاً معدنياً صلباً يغطي الجزء الخارجي للأسنان ويعمل على حمايتها. يتم تشكيل ميناء الأسنان (Amélogénèse) عن طريق خلايا تسمى أميلوبلاست (Améloblaste). تقوم هذه الخلايا بإفراز بروتين يسمى أميلوجينين (Amélogénine) يتدخل في تشكيل ميناء الأسنان. يعتبر التشكل غير التام لميناء الأسنان

(Amélogénèse imparfaite) مرضا وراثيا، يعاني المصابون به صعوبات في المضغ وآلام في الأسنان. لفهم الأصل الوراثي لهذا المرض نقدم المعطيات الآتية:


● **المعطى 1 :** تمثل الوثيقة 1 العلاقة بين بروتين الأميلوجينين (Amélogénine) وحالة ميناء الأسنان عند شخص سليم وعند شخص مصاب بمرض التشكل غير التام لميناء الأسنان.

1. بالاعتماد على الوثيقة 1، بين (ي)

العلاقة بين بروتين - صفة. (1ن)

● **المعطى 2 :** تتحكم في تركيب بروتين الأميلوجينين مورثة

تسمى "AMELX" توجد في شكل حليلين: حليل عادي وحليل طافر. تقدم الوثيقة 2 جزءا من اللولب غير المنسوخ لكل من الحليلين. وتقدم الوثيقة 3 جدول الرمز الوراثي.



الوثيقة 1

أرقام الثلاثيات	منحى القراءة	1	2	3	4	5
جزء من الحليل العادي	...	AAT	CAT	CCC	CGT	GCT...
جزء من الحليل الطافر	...	AAT	CAT	CTC	CGT	GCT...


الوثيقة 2

2. اعتمادا على معطيات الوثيقتين

2 و 3 ، حدد (ي) متتالية ARNm ومنتالية الأحماض الأمينية المطابقة لكل جزء من الحليل العادي والحليل الطافر، ثم فسر (ي) الأصل الوراثي لمرض التشكل غير التام لميناء الأسنان. (2 ن)

الحرف الثالث	G		A		C		U		الحرف الثاني
الحرف الأول	U	C	U	Tyr	U	U	Phe	U	U
U	UGU	Cys	UAU	Tyr	UCU	UUC	Phe	U	U
	UGC		UAC		UCC	UUA			
	UGA	بدون معنى	UAA	بدون معنى	UCA	UUG	Leu		
	UGG	Trp	UAG		UCG				
C	CGU	Arg	CAU	His	CCU	CUU	Leu		
	CGC		CAC		CCC	CUC			
	CGA		CAA	Gln	CCA	CUA			
	CGG		CAG		CCG	CUG			
A	AGU	Ser	AAU	Asn	ACU	AUU	Ile		
	AGC		AAC		ACC	AUC			
	AGA	Arg	AAA	Lys	ACA	AUA			
	AGG		AAG		ACG	AUG	Met		
G	GGU	Gly	GAU	Ac.asp	GCU	GUU	Val		
	GGC		GAC		GCC	GUC			
	GGA		GAA	Ac.glu	GCA	GUA			
	GGG		GAG		GCG	GUG			

الوثيقة 3



II. لفهم كيفية انتقال صفتين وراثيتين عند ذبابة الخل : لون الجسم ومظهر عروق الأجنحة. نقترح استثمار نتائج التزاوجات الآتية:

- **التزاوج الأول:** بين إناث من سلالة نقية بجسم رمادي وأجنحة بعروق مستعرضة وذكور من سلالة نقية بجسم أصفر وأجنحة بدون عروق مستعرضة. يتكون الجيل الأول F_1 المحصل عليه من أفراد بجسم رمادي وأجنحة بعروق مستعرضة.

- **التزاوج الثاني:** بين إناث من سلالة نقية بجسم أصفر وأجنحة بدون عروق مستعرضة وذكور من سلالة نقية بجسم رمادي وأجنحة بعروق مستعرضة. يتكون أفراد الجيل الأول F_1 من إناث بجسم رمادي وأجنحة بعروق مستعرضة وذكور بجسم أصفر وأجنحة بدون عروق مستعرضة.

3. بالاعتماد على نتائج التزاوجين الأول والثاني، **حدد(ي)، معللا (معللة)** إجابتك، كيفية انتقال الصفتين الوراثيتين المدروستين. (1.5 ن)


4. علما أن المسافة بين المورثتين المدروستين تساوي 13,4 cM، **ومستعينا (مستعينة)** بشبكة التزاوج، أعط النتائج المنتظرة من التزاوج بين أفراد الجيل الأول F_1 المحصل عليه إثر التزاوج الأول. (1.5 ن)

استعمل(ي) الرمز G و g بالنسبة لصفة لون الجسم، والرمزين N و n بالنسبة لصفة مظهر عروق الأجنحة.

التمرين 3 (4 نقط)

أشار التقرير السادس لمجموعة الخبراء الدوليين حول تطور المناخ (GIEC) بأن معدل درجة حرارة الأرض عرف ارتفاعا ب $1,1^{\circ}\text{C}$ منذ سنة 1900، ويعود هذا الارتفاع في درجة الحرارة (الاحتباس الحراري) بالأساس إلى الأنشطة الصناعية التي تحرر في المتوسط 35 Gt (Gigatonnes) من CO_2 في الغلاف الجوي كل سنة. تسمح المحيطات بتخزين 34% من CO_2 المحرر مما يمكنها من لعب دور خزان طبيعي للكربون. من أجل فهم دور هذا الخزان وعلاقته بالاحتباس الحراري، نقدم المعطيات التالية:

• **المعطى 1 :** تغطي المحيطات أكثر من 70 % من مساحة الكرة الأرضية، وتلعب دورا رئيسيا في تنظيم المناخ عن طريق امتصاص كمية كبيرة من CO_2 . تقدم



الوثيقة 1 تطور كمية انبعاثات CO_2 ، الناتجة أساسا عن الوقود الأحفوري، وكمية CO_2 الممتصة من طرف المحيطات بين 1995 و2015.

1. **باستغلال** معطيات الوثيقة 1، **أحسب (ي) الفرق بين كمية CO_2 المنبعثة وكمية CO_2 الممتصة خلال سنة 1995 وخلال سنة 2015، ثم صغ(ي) مشكلا علميا مرتبطا بهذا الفرق.** (0.75 ن)

• **المعطى 2 :** من أجل تفسير تغير الفرق بين كمية CO_2 المنبعثة وكمية CO_2 الممتصة من طرف المحيطات بين 1995 و2015 نقترح استغلال الوثائق التالية:



- يقدم الشكل (أ) من الوثيقة 2، دور المحيطات كخزان طبيعي للكربون، ويقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة مختلف الخزانات الطبيعية للكربون.

- يقدم الشكل (أ) من الوثيقة 3، تغير درجة حرارة مياه المحيطات (تم حسابها بالنسبة لمعدل درجة حرارة القرن العشرين) الناتج عن الاحتباس الحراري بين 1995 و 2015 ويقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتيجة دراسة تجريبية لقياس تغير كمية CO_2 المذابة بدلالة درجة حرارة الماء.

كمية الكربون المخزن (Gt بـ)	خزانات الكربون
50000000	الغلاف الصخري (الرواسب)
39000	الغلاف المائي (الماء)
760	الغلاف الجوي (الهواء)
610	الغلاف الإحيائي (الكائنات الحية)


الشكل (ب)

الوثيقة 2




الشكل (ب)

الوثيقة 3



الشكل (أ)

2. باستغلال شكلي الوثيقة 2، استنتج (ي) المكان النهائي لتخزين CO_2 . (1 ن)
3. باستغلال الوثيقة 3، والمعطيات السابقة، فسر (ي) تغير الفرق بين كمية CO_2 المنبعثة وتلك الممتصة من قبل



الوثيقة 4

المحيطات بين 1995 و 2015. (1 ن)
● المعطى 3 : اقترح خبراء GIEC ثلاث سيناريوهات ممكنة لتغير درجة الحرارة المتوسطة للأرض في أفق سنة 2100 حسب الإجراءات المتخذة للتخفيف من الاحتباس الحراري (الوثيقة 4). من بين هذه الإجراءات، نجد تقنية احتجاز وتخزين CO_2 التي تتمثل في تجميع CO_2 المنبعث من المصانع وتخزينه في الرواسب العميقة.

يمكن أن تصل قدرة التخزين الاصطناعي لـ CO_2 في هذه الرواسب إلى 2000 Gt.

4. بالاعتماد على الوثيقة 4 وعلى المعطيات السابقة وعلى معلوماتك، أحسب (ي) الفرق في تغير درجة الحرارة المتوسطة حسب كل سيناريو بين سنة 2000 وسنة 2100، ثم علل (ي) اللجوء إلى استخدام تقنية الاحتجاز والتخزين الاصطناعي لـ CO_2 من أجل تقادي السيناريو الذي سيكون له التأثير الأكبر على الاحتباس الحراري. (1.25 ن)